

CHIRURGIE PLASTIQUE, ESTHETIQUE ET RECONSTRUCTRICE
MICROCHIRURGIE, CHIRURGIE DE LA MAIN



Clinique Esthétique

L A F A Y E T T E

CENTRE AGRÉÉ
PAR LA DDASS

21 Rue Lafayette 31000 Toulouse
T. 05 61 21 99 04 - F. 05 61 13 66 56
contact@centresthetique.com

 Accès Métro Capitole

LES LÈVRES

PULPEUSES SANS EXAGÉRATION

Pour une bouche plus jeune et plus attirante

Les lèvres fines, les lèvres qui avec l'âge perdent leur collagène, la lèvre supérieure qui se plisse, les coins de la bouche qui s'affaissent, l'arc de Cupidon mal dessiné : que faire ?

REGALBER LA LEVRE

A la recherche de la perfection

1. Les produits de comblements

Il sont à base d'acide hyaluronique (Hylafrome, Juvederm, Restylane)

UNE SEULE SEANCE SUFFIT

- regalber les lèvres
- relever les coins de la bouche
- redessiner l'Arc de Cupidon
- remplir les rides, le produit de comblement associé à de très petites injections de Botox pour mettre au repos le muscle orbiculaire, tiendra plus longtemps

Résultat spectaculaire.

Bien toléré, sans effet secondaire.

Rapide, se fait en 15 minutes, peut se faire à l'heure du déjeuner, vous pouvez reprendre votre travail tout de suite après.

Mais la durée de vie est limitée (à renouveler tous les 6 mois).

2. la graisse

C'est le principe de déplacement des graisses : on prélève de la graisse à certains endroits (ventre - cuisses – genoux) et on la réinjecte dans les lèvres après l'avoir purifiée par centrifugation.

Spectaculaire et permanent car les cellules souches vont se différencier secondairement en fibroblastes qui vont sécréter le collagène.

Mais peut demander une 2ème séance de stabilisation.

C'est une intervention chirurgicale pratiquée en ambulatoire d'une durée d'une heure.

3. L'isolagèn : le futur est déjà là Les progrès de la biotechnologie.

Procédé qui utilise les cellules propres du patient, mises en culture, fabriquant les fibroblastes. Un fragment de peau est prélevé en arrière de l'oreille, envoyé au laboratoire Isolagen ; 6 semaines après sont renvoyées 3 seringues de 1cc, contenant des millions de fibroblastes pour être réinjectés au patient.

Si tout l'isolagen n'a pas été injecté en totalité, le restant peut être conservé au congélateur pour des réinjections ultérieures.

Les résultats sont visibles en quelques semaines.

- Procédé naturel
- Sans danger
- Hautement efficace, surtout quand combiné à la lumière intense pulsée

4 La greffe de derme ou de fascia prélevée au niveau du cuir chevelu

LISSER LES RIDULES DE LA LÈVRE SUPÉRIEURE

Lisser chez les gens âgés la lèvre atone desséchée, cassée, comme du cuir vernissé, à l'aide du laser ablatif CO2 qui redonne une lèvre supérieure lisse avec une vraie souplesse et une vraie douceur.

Mais avec des suites lourdes puisque brûle la couche superficielle : on doit rester chez soi 8 à 10 jours le temps que la peau brûlée disparaisse et soit remplacée par une nouvelle.

On doit se protéger du soleil pendant 6 mois car le nouvel épiderme est fragile.

L'aspect de la lèvre peut rester rosée pendant 3 mois mais c'est maquillable

Il existe toujours le risque de dépigmentation avec une lèvre qui devient de la couleur blanche d'une feuille de papier.