

CHIRURGIE PLASTIQUE, ESTHETIQUE ET RECONSTRUCTRICE
MICROCHIRURGIE, CHIRURGIE DE LA MAIN



Clinique Esthétique

L A F A Y E T T E

CENTRE AGRÉÉ
PAR LA DDASS

21 Rue Lafayette 31000 Toulouse
T. 05 61 21 99 04 - F. 05 61 13 66 56
contact@centresthetique.com

 Accès Métro Capitole

LES LÈVRES

PULPEUSES SANS EXAGÉRATION

Pour une bouche plus jeune et plus attirante

Les lèvres fines, les lèvres qui avec l'âge perdent leur collagène, la lèvre supérieure qui se plisse, les coins de la bouche qui s'affaissent, l'arc de Cupidon mal dessiné : que faire ?

REGALBER LA LEVRE

1 Les produits de comblements

Il sont à base d'acide hyaluronique (Juvederm, UltraSmile...)
le plus souvent

UNE SEULE SEANCE SUFFIT

- Regalber les lèvres
- Relever les coins de la bouche
- Redessiner l'Arc de Cupidon
- Remplir les rides
- Le produit de comblement, si associé à de très petites injections de Botox pour mettre au repos le muscle orbiculaire, tiendra plus longtemps
- Résultat spectaculaire.
- Bien toléré, sans effet secondaire.
- Rapide, se fait en 15 minutes, peut se faire à l'heure du déjeuner, vous pouvez reprendre votre travail tout de suite après.
- Mais la durée de vie est limitée (à renouveler tous les 12 mois).

2 la graisse

C'est le principe de déplacement des graisses : on prélève de la graisse à certains endroits (ventre - cuisses - genoux) et on la réinjecte dans les lèvres après l'avoir purifiée par centrifugation.

Spectaculaire et permanent car les cellules souches vont se différencier secondairement en fibroblastes qui vont sécréter le collagène.

Mais peut demander une 2ème séance de stabilisation.

C'est une intervention chirurgicale pratiquée en ambulatoire d'une durée d'une heure.

LISSER LES RIDULES DE LA LÈVRE SUPÉRIEURE

Lisser chez les gens âgés la lèvre atone desséchée, cassée, comme du cuir vernissé, à l'aide du laser ablatif CO2, ou une dermabrasion ou un peeling le plus souvent au phénol qui redonne une lèvre supérieure lisse avec une vraie souplesse et une vraie douceur.

Mais avec des suites lourdes puisque brûle la couche superficielle : on doit rester chez soi 8 à 10 jours le temps que la peau brûlée disparaisse et soit remplacée par une nouvelle. On doit se protéger du soleil pendant 6 mois car le nouvel épiderme est fragile.

L'aspect de la lèvre peut rester rosé pendant 3 mois mais c'est maquillable

Il existe toujours le risque de dépigmentation avec une lèvre qui devient de la couleur blanche d'une feuille de papier.

REBOOSTER LE DERME

Le laser fractionné

Avec un laser qui ne brûle pas l'épiderme et rentre directement dans le derme qui fait fabriquer à ce derme son propre collagène.

Cela demande plusieurs séances séparées de 3 semaines
Sans effet secondaire

Peut se faire à l'heure du déjeuner avec reprise du travail tout de suite après

RACCOURCIR LES LÈVRES QUI S'ALLONGENT AVEC L'AGE

Par la chirurgie en enlevant de la lèvre cutanée, avec la cicatrice au niveau du seuil de la narine pour qu'elle ne se voit pas.